



بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد

<http://fzhh.hums.ac.ir>

۰۷۶۳۵۴۲۱۵۷۸-۰۷۶۳۵۴۲۲۱۶۸

شناسنامه پفلت آموزشی کد: FZH.MNG.P-PH=44

عنوان	سپتی سمی عفونت خون در نوزادان
تهیه کننده	سوپر وایزر آموزش
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۲
ناظر کیفی	سوپروایزر آموزش سلامت
تایید کننده علمی	پزشک اطفال

اصول پیشگیری بیمارستان

۱. رعایت احتیاط های همه جانبه برای تمام موارد با نوزاد
۲. جلوگیری از ازدحام در اتاق نوزادان و محدودیت تماس با نوزاد
۳. شست و شوی دست ها
۴. محافظت دقیق پوست نوزاد
۵. کاهش خطر آلوده شدن کاتتر
۶. کاهش تعداد خونگیری و ویدی
۷. عدم کار پرسنل بیمار با نوزاد
۸. تعداد پرسنل پرستار کافی

نکته ی مهم!

شست شوی دست ها مهمترین و موثرترین روش برای کاهش عفونت های بیمارستانی است.



نکات قابل توجه برای پیشگیری

تعدادی از عفونت های داخل رحمی به وسیله درمان و ایمن سازی مادر قابل پیشگیری است. زنان حامله باید از نظر وجود هر گونه عفونت در کانال زایمانی مورد ارزیابی قرار گیرند.

علائم بیماری

معمولاً این آزمایش در هفته ۳۵ تا ۳۷ دوران بارداری انجام می شود و گاهی حتی می توان قبل از زایمان این

آزمایش را تکمیل کرد.

عفونت خونی

وجود علائم بیماری در نوزادی که سن کمتر از ۲۸ روز داشته همراه با کشت خون مثبت را عفونت خونی می گویند.

عفونت خونی یک حالت کاملاً اورژانسی است و باید درمان سریع شروع شود.

روش های انتقال عفونت به نوزاد

۱. عفونت های داخل رحمی

۲. عامل دیگر عفونت، عبور از کانال زایمانی است (در کانال زایمان انسان میکروب هایی وجود دارند، که منجر به عفونت در هنگام تولد می شود).

۳. خوردن مایع آلوده کیسه آب

۴. ورود مایع آلوده کیسه آب به داخل ریه ها

۵. بعد از تولد، نوزادان در معرض عوامل عفونی در بیمارستان یا جامعه هستند.

علائم بیماری


تب، شیر نخوردن، تنفس سریع، کیبودی، وقفه تنفسی، عدم دفع ادرار، ورم، خونریزی، اتساع شکم، زردی، تحریک پذیر، تشنج و...

شایعترین علامت عفونت در نوزادان شامل عدم علاقه یا اشکال در شیر خوردن می باشد.

۱. شرح حال مادر اطلاعات مفیدی در تشخیص بیماری می دهد.

۲. معاینه پزشکی

۳. تست های آزمایشگاهی که شامل کشیدن مایع از نخاع، آزمایش خون، کشت خون، کشت ادرار، رادیو گرافی قفسه سینه می باشد.



مهم ترین معیار تشخیص برای اثبات عفونت وجود کشت خون مثبت است.



درمان

وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن در نوزادان مستلزم مراقبت های ویژه و اقدام درمانی بیمارستان می باشد.

وقتی کشت های مناسب انجام گردید، درمانی آنتی بیوتیک داخل وریدی یا داخل عضلانی باید فوراً آغاز شود

نوع آنتی بیوتیک و طول مدت درمان با نظر پزشک معالج می باشد.