



۰۷۶۳۵۴۲۱۵۷۸-۰۷۶۳۵۴۲۲۱۶۸

شناسنامه پفلت آموزشی کد: FZH.MNG.P-PH=24

عنوان	داروی متادون و خطرات آن
تهیه کننده	سوپر وایزر آموزش
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۲
ناظر کیفی	سوپروایزر آموزش سلامت
تایید کننده علمی	پزشک داخلی

مسمومیت

افرادی که مصرف مقادیر بالایی از دارو را دارند ممکن است با اختلال در وضعیت تنفسی، شلی عضلات، سیاه شدن لب ها و پوست و خواب آلودگی بیش از حد مواجه شوند

اقدامات لازم در صورت مواجه شدن با فرد مسموم شده با متادون:

باید سریعاً بیمار را به اورژانس رساند.

بلافاصله با ۱۱۵ تماس حاصل نمائید تا بیمار را به اولین مرکز درمانی انتقال نمایند..

بهتر است بیمار را به یک پهلو خواباند تا از ورود ترشحات دهانی و معده ای به مجاری تنفسی جلوگیری گردد.

مهم ترین اقدام برقراری راه هوایی تنفس مصنوعی یا کپسول اکسیژن است. در صورتی که بیمار فاقد نبض است ماساژ قلبی شروع شود. پادزهر مسمومیت، نالوکسان میباشد که تجویز آن وریدی و توسط پرسنل درمانی صورت میگیرد.

موارد منع مصرف

در افراد با اختلالات تنفسی و بیماری انسداد مجاری تنفسی، در افراد معتاد به الکل و مبتلا به صرع و افرادی که دچار ضربه های مغزی شده اند و هم چنین در افرادی که به متادون حساس می باشند منع مصرف وجود دارد. متادون در بیماران با مشکل قلبی و بیماری های شدید کلیوی یا کبدی باید با احتیاط استفاده شود.

مصرف در بارداری و شیردهی

به دلیل ایجاد وابستگی و سندرم محرومیت پس از تولد نوزاد یا پس از قطع شیردهی، مصرف متادون در دوران شیردهی مجاز نمی باشد ولی در صورتیکه مادر اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد متادون بهترین جایگزین مواد مخدر برای اعتیاد است

عوارض جانبی

در دوز های معمولی عوارض جانبی رایج شامل تهوع، استفراغ، گر گرفتگی، یبوست، گیجی، خواب آلودگی می باشند. عوارض کمتر رایج میتوانند بصورت افت فشار خون وضعیتی، افزایش ضربان قلب، لرز، تعریق، اختلال در بینایی، توهم و احتباس ادرار بروز نمایند. هم چنین افرادی که به مدت طولانی از این دارو استفاده کنند ممکن است نسبت به اثرات آن مقاومت پیدا کنند.



مزیت درمان نگهدارنده با متادون

از نظر اقتصادی به صرفه تر است.

روش مصرفی آن خوراکی و غیر تزریقی است.

امکان انجام فعالیت های روزانه و رفتن به سرکار در حین مصرف دارو وجود دارد.

در مراکز مجاز عرضه شده و مصرف آن بهداشتی است.

به دلیل تهیه قانونی متادون، اجرای نظارت دقیق بر مصرف آن صورت میگیرد.

جلب همکاری خانواده و آمادگی روانی برای جدایی دائم فرد از مواد مخدر را تامین میکند.



متادون

متادون از دسته داروهای مخدر مصنوعی است که برای تسکین دردهای شدید و علائم ترک در افراد وابسته به مواد مخدر استفاده میشود. جذب این دارو از دهان شروع شده و در کبد متابولیزه میشود. تاثیر متادون از راه دهان یک ساعت پس از مصرف آغاز میشود و طی یک الی دو ساعت به حداکثر خود میرسد. این دارو می تواند حداقل تا ۳۶ ساعت در خون فرد باقی بماند.

