

## گزیدگی با زنبور :

زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش انواع زنبور مانند زنبور عسل و زنبور زرد و ... بروز نماید .

علائم زنبور گزیدگی معمولا در عرض چند ساعت ناپدید میشود . زنبورها به طور مکرر نیش میزنند و محل گزش آن ها به سادگی عفونی میشود .

چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و در ناحیه گردن و سر بروز نماید جدی تر است و می تواند تهدید کننده زندگی باشد .

درمان زنبور گزیدگی :نیش زنبور عسل به کیسه زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی میماند و محتویات کیسه به زخم منتقل میشود . بنابراین برداشتن سریع نیش از روی زخم جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است .

اگر فرد زنبور گزیده مشکل تنفسی داشت و یا تورم شدید و سریع در محل گزش بروز کرد باید به پزشک مراجعه نماید .

فرد زنبور گزیده برای چند روز از نظر تشدید درد یا باقی ماندن تورم یا علائم شبیه آنفولانزا و یا تب باید تحت نظر باشد .

روی محل گزش زنبور میتوان کمپرس سرد قرار داد و به طور متوالی هر 15 دقیقه آن را جابجا کرد .



## گزش رتیل

رتیل ها بندپایان بزرگ و پرز دار هستند که ظاهر ترسناکی دارند ، رتیل ها دارای گونه های سمی میباشند که تا زمانی تحریک نشوند یا تهدیدی را حس نکنند گاز نمیگیرند .

رتیل ها از دو قسمت از بدن خود استفاده میکنند .

آروارهای بزرگ و قوی

پرزهای روی بدن

علائم گزش رتیل

اسپاسم شدید عضلانی

درد در ناحیه قفسه سینه

درد در محل گزش

فردی که توسط رتیل گزیده میشود ممکن است فقط یک علائم را داشته باشد اما در بسیاری از مواقع همه موارد با هم بروز میکنند .

در ابتدا محل گزش بدون درد است سپس اطرافش قرمز شده و متورم میگردد پس از دو ساعت تبدیل به گر گرفتگی و عرق کردن میشود و پس از گذشت ۱۵ ساعت اسپاسم های شدید عضلانی شروع شده و احتمال سرگیجه و تهوع نیز میباشند.

درمان :

بسته به نوع رتیل اثرات آن متفاوت است میتوان از شل کننده های عضلانی و آرامبخش استفاده نمود.



بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد

<http://fzhb.hums.ac.ir>

۰۷۶۳۵۴۲۱۵۷۸-۰۷۶۳۵۴۲۱۶۸

شناسنامه پفلت آموزشی کد :FZH.MNG.P-PH=25

عنوان	گزش ها
تهیه کننده	سوپر وایزر آموزش
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۲
ناظر کیفی	سوپر وایزر آموزش سلامت
تایید کننده علمی	پزشک داخلی

در اکثر موارد درمان با انجام تست های آزمایشگاهی صورت میپذیرد که این آزمایشات در مرحله اول پذیرش و در ۴۸ ساعت اول هر ۶ ساعت یکبار تکرار میشود ..

آزمایش شامل: هموگلوبین، آزمایش ادرار، اختلالات انعقادی و در صورت شوک تعیین گروه خونی، مقدار اوره و گازهای خون شریانی میباشد .

هر بیمار عقرب گزیدگی که در طی ۲ ساعت اولیه گزش دچار تورم و تغییر رنگ موضع به شعاع ۱۰-۱۵ سانتیمتر در محل گزش شد یا دچار درد و حساسیت در غدد لنفاوی بشود یا علائم سیستمیک مسمومیت را نشان دهد باید در واحد مراقبت های ویژه بستری گردد .

در بیماران با گزش عقرب که علائم حساسیت ندارند بستری در بخش معمولی لازم میباشد .

سرم ضدعقرب یا ( antiscorpion venom serum ) به مقدار کافی باعث برطرف شدن تظاهرات عقرب گزیدگی میشود .

این فرآورده را باید در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد .

تزریق داخل عضله باید به آهستگی انجام شود

در صورت اختلال آزمایشات انعقادی به دستور پزشک ممکن است از تزریق فاکتورهای خونی از قبیل پلاسما و پلاکت نیز استفاده شود .



علائم و شدت مسمومیت ناشی از عقرب گزیدگی به نوع و بزرگی عقرب و همچنین شرایط جسمی و سنی مصدوم بستگی دارد ، کودکان و افراد مسنی که بیماری قلبی دارند، بیشتر از دیگران در معرض مسمومیت شدید هستند .

گزش عقرب میتواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود اما علائم تهدید کننده حیات و حوادث منجر به مرگ به ندرت رخ میدهد .

تورم ناشی از گزش عقرب عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی و سوزش در ناحیه گزش برای ۴ تا ۶ ساعت به وجود میآید و معمولاً پس از ۲۴ ساعت بهبود می یابد .

تعدادی از بیماران علائم شدید زیر را نشان میدهند :

اختلال در بلع ،سفتی عضلات ،پرش و بی قراری در اندامها ،افزایش فشار خون ،کاهش یا افزایش شدید ضربان قلب ،سرگیجه ،حالت تهوع و استفراغ ،بی اختیاری ادرار و مدفوع ،تنگی نفس ،تشنج

اقدامات لازم: قبل از انتقال مصدوم به مرکز درمانی باید بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیری نمائید

هر چه سریعتر فرد را به اورژانس بیمارستان منتقل کنید و زمان را برای کشتن و گرفتن عقرب از دست ندهید .

گزش در مواقعی رخ میدهد که یک حشره برای تغذیه یا برای دفاع از خود یا مکانسیم دفاعی فردی را نیش میزند .برخی حشرات پس از نیش زدن اقدام به تزریق فرمیک میکنند که می تواند منجر به واکنش های آنی پوست که معمولاً علائمی مانند: نظیر قرمزی، تورم و سوزش در ناحیه سوزش گزش می باشد.

گزش مورچه ،زنبور (زنبور عسل،زنبور زردو...) دردناک است و ممکن است در افرادی که به گزیدگی حساسیت دارند موجب آلرژیک شدید به نام شوک آنافیلاکسی شوند.

گزش پشه و کک بیشتر از درد موجب خارش میشود.

واکنش به نیش و گزیدگی معمولاً تا چند روز طول میکشد.

عقرب ها :

عقرب ها وابسته به عنکبوتیان هستند .در دنیا گونه های متعددی عقرب وجود دارد که تنها تعدادی محدود برای انسان خطرناک هستند .

عقرب بیشتر در آب هوای گرم و شب ها فعال هستند، این جاندار معمولاً در اطراف خانه ها و در محل های خلوت وزیر وسایل چوبی مخفی و شب ها برای شکل از محل خارج میشود .

گزش عقرب معمولاً اتفاقی است و زمانی بروز میکند که فرد بدون اطلاع از وجود این جاندار دست خود را زیر وسایل نگهداری شده در انبار کند یا در شب و با پای برهنه در تماس با عقرب قرار گیرد .